Stephani drawings
Reynold Hatcher 1930-67 had
one - went with his library
to U. Wisconsin

Melbourne, Univ. Bot. Dept. Library has
1064 Stephani copies of Australasian heps.

Scott, N Zeal Journ Bot. 9 : 743. 1971

Scheffer unders to
Verdoorn ✓
Fulford ✓
Bonner ✓
Savicz - Sub.
~~Pearsin~~?

Grallet ✓
Schuster ✓
Jorett ✓
~~Droat~~
~~G.S.~~
Anderson ✓

---

30 - ~~keep 10~~
send 8 free
sell / Goldstein 3.00
Keep G.S.
library
2 for Herb

$$\begin{array}{r} 140 \\ 5 \\ \hline 7.00 \end{array}$$

Paid $300 for the Stephani replicas

(letter to Vannini 23 May 1925)

Letters vol 28

Erste Sendu

Index.

Anomalejeunea	3 Sp.	3
Anoplolejeunea	4 "	7
Aphanolejeunea	11 "	11
Archilejeunea	73 "	83
		104

Aneura: Poeppigii. – polymorpha. – portoricensis. – prehens
ramosissima. – Regnellii. – reticulata. – Ridleyi. – s
tiflora. – samoana. – scabra. – Schwaneckei. – sing
gana. – singapurensis. – spectabilis. – Spegazzinia
spinulifera. – squarrosa. – Stephanii. – stipatiflora
stolonifera. – subexalata. – subsimplex. – sumatran
tahitensis. – tamariscina. – tasmanica. – tenax. – te
costata (crenulata, nom. occ.) –. tenuic$\overset{u}{o}$la. – tenuis. – t
bodensis. – trichomanoides. – virgata. – viridissim
vitiensis. – Wallisii. – Wettsteinii. – Zollingeri
Anthoceros affinis. – alatifrons. – amboinensis. – amoenu
andinus. – Novae-Zelandiae. – angustus. – apiahy
arachnoideus. – areolatus. – argentinus. – argill
~~[illegible]~~. – atlandicus. – Bolanderi. – brevi
capsulus. – Brotheri. – brunneus. – bulbiferus. –
Bütleri. – Buttneri. – caespiticius. – caledonicu
buitenzorgius. – carnosus. – carolinianus. – c
taractarum. – caverno-inflatus. – cavernosus. – c
bensis. – chinensis. – coariaceus. – Colensoi. – c
lumbianus. – communis. – constans. – costatus.
crassifrons. – crasseus. – crenatifrons. – crispulus. –
crispus. – cristatus. – cristisporus. – cristulatus. – cub
cucullatus. – Curnowii. – dendroceroides. – denticula
dichotomus. – Dussii. – dilatatus. – dioicus. – Ecklon
elegans. – Elmeri. – endiviaefolius. – erectus. – evan
exiguus. – expansus. – falsinervis. – Faurianus. –
Ferd. Mülleri. – fertilis. – fimbriatus. – fissifrons. – f
flagellaris. – flavens. – flexivalvis. – floribundus. – f
natis. – Formosae. – fragilis. – fructuosus. – fuci

Index:

	Species.	Copien.
Brachiolejeunea.	70.	87.
Bryopteris.	16.	19.
Caudalejeunea.	18.	25.
Ceratolejeunea.	91.	91.
Harpalejeunea.	50.	52.
Hygrolejeunea.	112.	121.
Leiolejeunea.	2.	3.
Leptocolea.	28.	30.
Leptolejeunea.	58.	62.
Leucolejeunea.	6.	7.
Lopholejeunea.	82.	90.
Macrolejeunea.	4.	5.
Marchesinia.	28.	34.
Mastigolejeunea.	66.	72.
Microlejeunea.	67.	77.
Myriocolea.	1.	2.
Neurolejeunea.	5.	6.
Odontolejeunea.	14.	17.
N° 1– 14^{b}.		800

Stephani lists.

Acolea: andreaeoides, Ldb., — atrata, Mitt.,
atrocapilla, H. & T., — brevissima, Dum., —
cochlearis. — concinnata. — coralloides. —
crenulata. — denticulata. — Fauriana. — miniata. —
obtusa. — revoluta. — stricta. — stygia. — varians.
Adelanthus: brevicaulis. — Crossii. — cubanus. — decipiens. —
decurvus. — Dugortiensis. — falcatus. — magellanicus.
sphalerus. — unciformis. —
Acrobolbus: bilobus. — bispinosus. — campylodontus. — ciliatus.
cinerascens. — excisus. — lophocoleoides. madagascariensis. — Mittenii. — unguiculatus. — Wilsonii. — Aromastigum. —
Alicularia: Breidleri. — compressa. — japonica. — Lindmanii. —
minor. — notoscyphoides. —
Alobiella: bifida. — borbonica. — dominicensis. — Dusenii. heteromorpha. — Husnoti. — latiflora. — parvifolia. — pulvinata. — roſa. —
Anastrepta: bifida. — longissima. — arcadensis. —
Anastrophyllum: adulterinum. — apertifolium. — assimile. —
bidens. — calocystum. — conforme. — crebifolium.
decurrens. — Donnianum. — erectifolium. — Esenbeckii.
fissum. — Glaziovii. — Harrisanum. — japonicum. —
incrassatum. — involutifolium. — Karstenii. — laxifolium. — leucocephalum. — leucostomum. — Mandonii.
piligerum. — Reichardtii. — revolutum. — schismoides. —
schizopleurum. — verrucosum.
Androcryphia confluens.

Aneura: aberrans.- aequitexta.- alata.- albo-marginata.- alcicornis.- algaeides.- alterniloba.- amazonica.- ambainensis.- andina.- androgyna.- attenuata.- antarctica.- Baldwini.- barbiflora.- bogotensis.- Breutelii.- caespitans.- calcarea.- calva.- canaliculata.- cataractarum.- cervicornis.- ciliolata.- cochleata.- Colensoi.- comosa.- compacta.- conimitra.- corralensis.- crassiretis.- crenulata.- crispa.- decrescens.- dentata.- diablotina.- dicrana.- digitiloba.- dilatata.- diminuta.- distans.- elata.- emarginata.- erecta.- eriocaula.- erosa.- fastigiata.- Fendleri.- flaccidissima.- floribunda.- fucoides.- fuegiensis.- fuscescens.- Glaziovii.- gogolensis.- gracilis.- Graeffei.- granulata.- grossidens.- heteroclada.- hymenophylloides.- hymenophytoides.- Jackii.- inconspicua.- incurvata.- intermedia.- Karstenii.- Kowaldiana.- laticostata.- latifrondoides.- latifrons.- ~~Lepervanchea.-~~ ~~Leperp~~ Lepervanchei.- lepidomitra.- leptophylla.- Levieri.- limbata.- lobata.- longiflora.- longispica.- Loriana.- macrostachya.- Makinoana.- marginata.- maxima.- metzgeriaeformis.- micropinna.- minima.- multifida.- multifidoides.- Nadeaudii.- Negeri.- nitida.- nobilis.- nudiflora.- oppositiflora.- palmata.- pallida.- pallide-virens.- papillata.- papulosa.- parvula.- pauciramosa.- pectinata.- perpusilla.- pinguis.- pinnatifida.- planifrons.- platyclada.- plumaeformis.- plumosa.-

Aneura: Poeppigii. - polymorpha. - portoricensis. - prehensilis. - ramosissima. - Regnellii. - reticulata. - Ridleyi. - saccatiflora. - samoana. - scabra. - Schwaneckei. - singalangana. - singapurensis. - spectabilis. - Spegazziniana. - spinulifera. - squarrosa. - Stephanii. - stipatiflora. - stolonifera. - subexalata. - subsimplex. - sumatrana. - tahitensis. - tamariscina. - tasmanica. - tenax. - tenuicostata (crenulata, nom. occ.) -. tenuic$\overset{u}{o}$la. - tenuis. - tjibodensis. - trichomanoides. - virgata. - viridissima. - vitiensis. - Wallisii. - Wettsteinii. - Zollingeri. -

Anthoceros affinis. - alatifrons. - amboinensis. - amoenus. - andinus. - Novae-Zelandiae. - angustus. - apiahynus. arachnoideus. - areolatus. - argentinus. - argillaceus. ~~atlanticus~~ - atlandicus. - Bolanderi. - brevicapsulus. - Brotheri. - brunneus. - bulbiferus. - Butleri. - Buttneri. - caespiticius. - caledonicus. - buitenzorgius. - carnosus. - carolinianus. - cataractarum. - caverno-inflatus. - cavernosus. - celebensis. - chinensis. - coariaceus. - Calensoi. - columbianus. - communis. - constans. - costatus. - crassifrons. - crasseus. - crenatifrons. - crispulus. - crispus. - cristatus. - cristisporus. - cristulatus. - cubanus. cucullatus. - Curnowii. - dendroceroides. - denticulatus. dichotomus. - Dussii. - dilatatus. - dioicus. - Ecklonii. - elegans. - Elmeri. - endiviaefolius. - erectus. - evanidus. exiguus. - expansus. - falsinervis. - Faurianus. - Ferd. Mülleri. - fertilis. - fimbriatus. - fissifrons. - fissus. flagellaris. - flavens. - flexivalvis. - floribundus. - fontinalis. - Formosae. - fragilis. - fructuosus. - fuciform-

Aneura: fusiformis. – giganteus. – glandulosus. – Glaziovii. – Gollani. – gracilis. – grandis. – granulatus. – grossilamellus. – guadelupensis. – guatemalensis. – Hallii. – Harrisanus. – hawaicensis. – Helmsii. – Hildebrandtii. – himalayensis. – hirticalyx. – hirtus. – hispidus. – Hookeri. – Husnoti. – Jamesoni. – japonicus. – javanicus. – incurvus. – indicus. – inflatus. – Jollyanus. – Kerneri. – Koreanus. – Kunzeanus. – laciniatus. – lamellatus. – lamellisporus. – laminiferus. – latifrons. – leiosporus. – leptohymenius. – levis. – Longanus. – longicapsulus. – longispirus. – Macounii. – macrosporus. – maderensis. – Mandoni. – maranguensis. – maritimus. – martinicensis. – mexicanus. – microsporus. – minarum. – Miyabenus. – Miyakeanus. – Miyoshianus. – monandrus. – monospirus. – multilobulus. – multicapsulus. – multifidus. – mussuriensis. – nagasakiensis. – Novae Guineae. – nagasakiensis. – Nymannii. – orizabensis. – padangensis. – pallens. – pallidus. – papulosus. – parvulus. – Pearsani. – peruvianus. – philippinensis. – phymatodes. – pichinchensis. – pinnatus. – planus. – pluvialis. – polyandrus. – preangeranus. – propaguliferus. – Puiggarii. – pulcherrimus. – punctatus. – pusillus. – radicellosus. – Remyanus. – reticulatus. – rigidus. – rupicolus. – sambesianus. – santosensis. – schizophyllus. – Schlimianus. – seriatus. – silvaticus. – solidus. – spinisporus. – Stableri. – Stahlii. – striatus. – Stuhlmannii. – subcostatus. – sumatranus. – Tamurae. – tavetanus. –

Aneura. telaganus.– tenax.– tenerrimus.– tenuis.– tenuissimus.– tetrandrus.– tjibodensis.– tonkinensis.– tuberculatus.– undulatus.– validus.– venosus.– Vescoanus.– vesciculosus.– vincentianus.– Volkensii. Wiemannii.– Wrightii.– Wettsteinii.–

Arachniopsis coactilis.– dissotricha.– pecten.–

Arnellia fennica.

Balantiopsis. aequiloba.– angustifolia.– brasiliensis.– bisbifida.– Brotheri.– cancellata.– chilensis.– convexiuscula.– diplophylla.– erinacea.– Hockeni.– purpurata.– rosea.– latifolia.– tumida.–

Blasia pusilla. F. Hb. 7.–

Blepharostoma. antillarum.– arachnoideum.– corrugatum. palmatum.– pinnatisetum.– pulchellum.– quadripartitum.– setigerum– trichophyllum.– Whiteleggei.

Calobryum. andinum. – Blumei.– mnioides.

Calycularia. Blyttii.– birmensis.– crispula.– Flotowiana.– hibernica.– laxa.– radiculosa.–

Calypogeia. acuta.– aeruginosa.– alternifolia.– amazonica. abnormis.– angusta.– apiculata.– arguta.– biapiculata.– bidentula.– biforca.– caespitosa.– cellulosa.– cordifoli. cordistipula.– cuspidata.– cyclostipa.– decurrens.– densifolia.– Dussiana.– Elliottii.– fissa.– furcata. fusca.– gigantea.– Goebelii.– grandistipula.– Hartlessiana.– hawaica.– heterophylla.– imbricata.– integristipula.– latifolia.– laxa.– Lechleri.– lophocoleoides.–

Calypogeia lunata.— marginella.— microstipula.— Mülleri.— nephrostipa.— parallelogramma.— peruviana.— portoricensis.— Puiggariana.— renistipula.— rhombifolia.— suberectifolia.— suecica.— submersa.— subtropica.— sphagnicola.— tenax.— tosana.— Trichomanis.— Id. var. erecta.— Uleana.— vincentina.— Yoshinagana.—

Cavicularia densa.—

Cephalozia aequiliseta.— aeraria.— affinis.— albescens.— amplexicaulis.— aquatica.— arenaria.— asperrima.— aspriella.— aterrima.— Austini.— badia.— Bastowii. Baumgartneri.— bicuspidata.— biloba.— borealis.— brunnescens.— Bryhnii.— byssacea.— capillaris.— catenulata.— connivens.— crassicaulis.— cucullifolia.— dentata.— divaricata.— Douinii.— Dusenii.— elachista.— elegans.— exiliflora.— extensa.— fissa.— fissifolia.— fluitans.— forficata.— Francisci.— furcifolia.— Gollani.— gracillima.— granatensis.— grossitext.— hakkodensis.— hebridensis.— hirta.— hypogyna.— Jackii.— integerrima.— intertexta.— Kiaeri.— Kirkii.— lacinulata.— Lamersiana.— latiflora.— leucantha.— Levieri.— lucens.— macrostachya.— macrostipa.— Massalongi.— media.— Neesiana.— ochiajana.— ovalifolia.— pallida.— parvitexta.— patula.— patulifolia.— Pearsoni.— phyllacantha.— planifolia.— pleniceps.— recurvifolia.— rhizantha.— robusta.— rubriflora.— rufa.— sandvicensis.— serra.— serrata.— simulans.— pulchella.—

Cephalozia: Skottsbergii.- squarrosula.- striatula.-
Sullivantii.- tubulata.- Turneri.- Vallis gratiae.-
varians.- verrucosa.- virginiana. Welwitschiana.
Chaetocolea: palmata.-
Chandonanthus: birmensis.- filiformis.- hamatus.-
hirtellus.- piliferus.- pusillus.- setiformis.-
squarrosus.-

	Species.		Sp.
Chiloscyphus	128.	Lepidozia	202.
Clasmatocolea	5.	Lophocolea	255.
Cuspidatula	4.	Lophozia	53.
Delavayella	1.	Madotheca	149.
Dendroceros.	32.	Makinoa	3.
Diplophyllum	16.	Marsupella	33.
(Fimbriaria fehlt(	—	Marsupidium	9.
Fossombronia	35.	Mastigobryum	308.
(Frullania fehlt)	—	Mastigopelma	2.
Geocalyx	3.	Mastigophora	10.
Gongylanthus	11.	Metzgeria	65.
Gyrothyra	1.	Metzgeriopsis.	1.
Haplomitrium	1.	Micropterygium	9.
Harpanthus	2.	Monocolea.	2.
Herpocladium	2.	Myriocolea	1.
Hygrobiella	6.	Mytilopsis.	1.
Hymenophytum	5.	Notoscyphus	7.
Jackiella	4.	Nowellia	3.
Jamesoniella	24.	Odontoschisma	24.
Isotachis	46.	Pallavicinius	27.
Jubula	13.	Pellia	3.
Jungermannia	36.	Plagiochila	714.
Leioscyphus	36.	Pleuroclada.	2
Lembidium	5.	Pleurozia	9.
Lepicolea	5.	Psiloclada	3.
Lepidolaena	8.	Pteropsiella	2.

	Spec.
Ptilidium	4.
Radula.	211.
(Riccia fehlt) —	
Saccogyna	11.
Scapania	72.
Schiffneria	3.
Schisma	68.
Schistochila	77.
Solenostoma	32.
Southbya	3.
Sphenolobus	20.
Spruceella	1.
Stephaniella	2.
Symphogyna.	39.
Symphomitria	6.
Syzygiella	17.
Treubia	2.
Trichocolea.	26.
Tylimanthus	23.
Wettsteinia.	1.
Zoopsis	9.

(Alle Lejeuneaceae fehlen. —)

Index:

	Species.	Copien.
Ptychanthus.		27.
Ptychocoleus.	80.	85.
Pycnolejeunea.	73.	85.
Rectolejeunea.	40.	40.
Stictolejeunea.	5.	6.
Strepsilejeunea.	56.	57.
Symbyecidium.	17.	20.
Taxilejeunea.	128.	136.
Trachylejeunea.	25.	29.
Thysanantus.	42.	51.
Bucegia.	1.	1.
Clevea.	9.	10.
Conocephalum.	3.	7.
Cronisia.	1.	1.
Cryptomitrium.	1.	3.
Cyathodium.	3.	5.
Dichiton.	2.	2.
Dumortiera	2.	4.
Eremonotus	1.	1.
Exormotheca	6.	6.
Fimbriaria	92.	101.
Frullania (Chonanthelia)	108.	123.
		800.

Index.

	Species	Copien.
Cheilolejeunea	71.	73.
Colura	27.	29.
Crossotolejeunea	27.	28.
Cyclolejeunea	24.	33.
Cystolejeunea	1.	2.
Dicrano lejeunea	39.	45.
Diplasiolejeunea	24.	26.
Drepanolejeunea	78.	85.
Eu- lejeunea	190.	203.
Euosmo-lejeunea	38.	49.
Omphalanthus	4.	4.
Otigoniolejeunea	11.	11.
Pelto-lejeunea	7.	9.
Physocolea	119.	123.
Potamolejeunea	7.	8.
Prionolejeunea	58.	62.
Ptychanthus №: 1_10 inclus.	10.	10.
		800.

Index.

Frullania, Diastaloba.		14.
Funicularia.	2.	2.
Göbeliella.	1.	2.
Gollaniella.	2.	3.
Grimaldia.	7.	11.
Kornickia.	1.	1.
Lunularia	1.	1.
Marchantia	100.	114.
Massalongoa	1.	2.
Neesiella	3.	4.
Peltolepis	1.	2.
Petalophyllum.	3.	3.
Pigafettea.	1.	1.
Plagiochasma.	46.	52.
Ponafella.	1.	1.
Preissia.	1.	2.
Protocephalozia.	1.	1.
Rebulia,	1.	6.
Riccia,	121.	143.
Ricciella,	70.	75.
Ricciocarpus,	2.	2.
Riella,	7.	7.
Rupinia,	2.	2.
Sakkiella.	1.	1.
Sauteria.	2.	3.
Sphaerocarpus.	4.	4.
Targionia.	3.	4.
		463.

		463.
Tritomaria.	4.	6.
Wiesnerella.	1.	3.
Anthoceros.	27.	29.
Megaceros.	11.	10.
Aspiromitus.	12.	12.
Dendroceros.	45.	45.
Notothylas.	10.	10.
Acolea.	25.	32.
Acrobolbus.	14.	16.
Acromastigum.	1.	1.
Adelanthus.	10.	16.
Alicularia.	7.	13.
Alobiella.	15.	18.
Anastrepta.	5.	6.
Anastrophyllum. [Aneura Sdg.	53.	65.
Androcryphia.	2.	5.
Anthelia.	3.	3.
Arnellia.	1.	2.
Arachniopsis	5.	9.
Balantiopsis	27.	33.
Blasia	1.	2.
(Blepharostoma) Sdg.		
Bucegia	1.	1.
		800

Sendung II.

Index: von Sendung II

	Species.	Copien.
Aneura	327.	342
Blepharostoma	13.	20.
Calobryum	4.	9.
Calycularia	7.	8.
Calypogeia	84.	92.
Cavicularia	1.	2.
Cephalozia	142.	167.
Chaetocolea	1.	1.
Chandonanthus	14.	16.
Chiloscyphus		143.
		800.

I– IV. No 1– 125

Index zu Sendung VIII.

	Species	Copien
Chiloscyphus Nr 126_ 182.	57.	78.
Clasmatocolea	6.	7.
Conoscyphus	2.	4.
Cuspidatula	5.	8.
Delavayella	2.	3.
Diplophyllum	28.	31.
Fossombronia	50.	62.
Geocalyx	3.	4
Gongylanthus	12.	13.
Gyrothyra	1.	2.
Haplomitrium	1.	2.
Harpanthus	3.	4.
Herpocladium	6.	7.
Hygrobiella	7.	7.
Hymenophytum	5.	6.
Jackiella	4.	6.
Jamesoniella	61.	79.
Isotachis	75.	93.
Jubula	17.	17.
Jungermannia	92.	95.
Leioscyphus	55.	65.
Lembidium	8.	8.
Lepicolea	12.	13.
Lepidolaena	12.	14.
Lepidozia Nr 1_ 164 incl.	164.	173.
		801

Index zu Sendung

		Species.	Copien.
Lepidozia, Dum 1831.			
ab. III. 3ª Nº 165 – 180	= 16 Sp. 18 C.		
b.	20 " 26. "		
IV.	95 " 99 "		
V	15 " 15 "		
VI	10 " 12		
	156 Sp. 170 C.	156.	170.
Lophocolea, Dum. 1835.			
I – VI.		390.	430.
Lophozia, Dum. 1831.		64.	86.
I. – III.			
Madotheca, Dum. 1822.			
I – V Nº 97 inclus.		97.	114.
			800 C.

Index zu Sendung X

800 Copien von „Icones Hepaticarum"
von Franz Stephani.

	Species.	Copien.
Makinoa, Miyake, 1899.	1.	1.
Marsupella, (I–VI.), Dum., 1835.	55.	72.
Marsupidium, Mitten, 1867.	9.	10.
Mastigobryum (A–D.), Nees, 1844.	489.	524.
Mastigopelma, Mitten, 1878.	2.	2.
Mastigophora, Nees, 1838.	21.	24.
Metzgeria, Raddi, 1820.	132.	132.
Micropterygium, Lindberg. N.s.G., 1844.	10.	10.
Monoclea, Hooker 1820	2.	2.
Mytilopsis, Spruce, 1882.	1.	1.
Nowellia, Mitten, 1870.	4.	4.
Notoscyphus, Mitten 1862.	9.	18.
		800.

Index. zu Sendung XI

d. 25. Juli 1932.

800 Copien der "Icones hepaticarum" von Franz Stephani.

		Species.	Copien.
Odontoschisma,	Dum.	29.	29.
Pallavicinius,	gray.	35.	36.
Pellia,	Raddi.	3.	4.
Plagiochila,	Dum.		
Patulae.			
A. I – VIII.		195.	216.
B. I – VI.		67.	69.
C. I – VII.		163.	173.
D. I IV.		40.	46.
E.		10.	11.
Ampliatae.			
A.		10.	14.
B. I – V.		42.	48.
C. I. II. III. IV.			
V. 129 – 141 incl.		141.	154.
			800.

= 515

515
216
176
61
115
372
1455

2

Index. Sendung XII.

800 Copien von Zeichnungen der
„Icones Hepaticarum“ von Franz Stephani.

	Species.	Copien.
Plagiochila (Fortsetzung.) Ampliatae.		
C. V ab No. 143 Plag. consimilis		
" VI. VII. VIII. IX.	166.	176.
D. I – VII.	55.	61.
E. I – VII.	114.	115.
F. I – VIII.	365.	372.
Pleuroclada. Spruce 1882.	2.	2.
Pleurozia. Dum. 1835.	14.	16.
Psiloclada.	3.	3.
Pteropsiella.	1.	
Ptilidium.	6.	7.
Radula. Dum 1835.	43.	48.
I. II.	769.	800.

Index

zu Sendung: XIII.
den 17. Januar 1934.

„500 Copien" von Zeichnungen
der „Icones hepaticarum" von Franz Stephani.

			Species.	Copien.
Radula, Dum. 1835. Fortsetzung.				
III. Ampliatae	81 Sp.	97 Cop.		
IV. Communes	94 „	98 „		
V. Microlobae	21 „	26 „		
VI. Longilobae	16 „	19 „		
VII. Amentulosae ...	11 „	11 „	223.	251.
	223	251		
Saccogyna, Dum. 1882.			13.	14.
Scapania, Dum. 1835.				
I. Septentrionales	43 Sp.	51 Cop.		
II. Asia et Oceania trop.	27 „	28 „		
III. America tropica	6 „	7 „	102.	112.
IV. Japonica	26 „	26 „		
Schiffneria, Steph. 1894.			3.	4.
Schistochila, Dum. 1835.				
I. Africa	6 Sp.	7 Cop.		
II. Asiaticae incl. Jap.	48 „	55 „		
III. Australia Tasmania	7 „	7 „		
IV. Nova Zelandia	15. „	19 „		
V. Antarcticae. Falklands Ins^{ae}.	24 „	27 „	100.	115.
Sprucella, Steph. 1860.			1.	1.
Stephaniella, Jack. 1874.			3	3
				500.

Index zu Sendung XIV.

vom 7. Februar 1933.

		Species.	Copien.
Schisma,	Dum, 1822.	91.	94.
Solenostoma,	Mitten, 1867.	50.	58.
Southbya,	Spruce, 1850	2.	3.
Sphenolobus,	Lindbg.	28.	32.
Symphyogyna,	Mont. et Nees. 1836.	62.	67.
Symphyomitra,	Spruce, 1885.	4.	4.
Syzygiella,	Spruce, 1876	28.	28.
Treubia,	Goebel,	2	2.
Trichocolea,	Dum. 1822.	47.	47.
Tylimanthus,	Mitten. 1867.	55.	56.
Wettsteinia,	Schiffner, 1898	1.	1.
Zoopsis,	Hooker, 1844	11.	11.
		381.	403.

Stephani herb FH

✓ Plagiochila falcata St - Brasilia, Puiggari 879
(but w P. confertissima)

✓ Jamesoniella spectabilis? De Not, Patagonia, Hatcher

✓ Plag. aberrans St, Sumatra Schiffn 880
✓ " acanthophylla G. Java " 720
" Didricksonii St, Nicobaren, Diedrichsen
✓ Plag. aequitexta St, Borneo, Everett
" decurvifolia St., Tasmania, Mt Laperouse, Oldfield
✓ Plag. aëra Taylor Costarica Pittier 6033
✓ " amoena St. Puertorico Sintenis
✓ " amplexicaula St, Martinique Duss 684 = P. Dussiana St, Mart. Duss 602
✓ " angustissima St. Madagascar Hildebrandt
✓ " angustisedens St Columbia Moritz
✓ " contorta (?) Segovia, Oersted
✓ Plag. apicalis? G. Brasilia Puiggari 1883 (stems w [illegible])
✓ " argentina St, Argentina, Lorentz
✓ Plag Barteri Mitten, S. Leone, Barter
Plag. biapiculata St. Costarica Pittier + Durand
✓ " bidentata St, Staten Isl, Spegazzini
✓ " Bonplandii G. Bolivia, Bonpland
✓ " Capensis St Cap MacOwan ✓
✓ " Chenagonii St Madagascar Chenagon
" ciliata G Sikkim, Stocks 55
✓ " clavato-saccata St, Sumatra Micholitz
✓ " confertifolia Taylor - Brasilia Sello
" dissecta St. Himalaya Dr Prain 165

Johanna Stephani letters to
Draper

28 Jy 1926 (#112) she sends 800 copies of her
father's Zeichnungen — There is an index in
pocket #1

2 Je 1927 - sending 5 is only 140 copies at $37.00
father d 23 Feb

10 Oct 27 - sends 800 copies drawings (chk for $40 recd)
3 Mar 28 " " "

J. Steph

12 Sept 1928

she has sent copies of dr to

Setchell, Berkeley
U. Mich.
Stanford U.
Mrs CC Haynes who intends
to present them to Evans at Yale

8 Aug 29 - sends 800
(sending 10 $40)

~~30 Aug 30~~
4 Mar 31 - asks may ship send the remaining ca 1700 copies in bulk.

25 Jy 32 - sends 800C, sending x1

29 Mar 33 " " , proposes to send an "Index" which is

280 dr of each genus & subgenus for $6

after Th's death? 29 Dec 33 - P.H. has had books made for
them, also send the index
17 Jan 34 - sends 500 (x iii)
7 Feb 34 - sends the last 403 do

Stephani letters are Journal + date from
11 Dec 23 (rel) Feb 1934 (p128)

Charter vol 26

In library

STEPHANI DRAWINGS - HEPATICAE

VOL I - XXIII 9,093 SPECIES

STEPHANI DRAWINGS – HEPATICAE

VOL. 1 – ✓609 SPECIES
VOL. 2 – ✓487
3 – ✓432
4 – ✓477
5 – ✓392
6 – ✓523
7 – ✓342
8 – ✓366
9 – ✓402
10 – ✓381
11 – ✓395
12 – ✓470
13 – ✓265
14 – ✓349
15 – ✓393
16 – ✓437
17 – ✓341
18 – ✓366
19 – ✓479
20 – ✓237
21 – ✓378
22 – ✓332
23 – ✓240

9,093

ALL SPECIES ARE INDEXED IN SECTIONS: (INDEX COULD BE MADE BY TYPING THESE LISTS.)

34[illegible]
28) 9093
[illegible]

Stephani

References

Thayter in Harvard Alumni Bulletin, March 17, 1927
recently acquired, the "Miniature Herbarium" of Stephani –
portions of specimens of foliose hepatics which he examined
or described. c 3500 species (by count, 3584)

STEPHANI HERBARIUM

INDEX

Acolea
Acrobolus
Acrochile
Acromastigum
Adelanthus
Alicularia
Alobiella
Anastrepta
Anastrophyllum
Androscyphia
Aneura
Anthoceros
Anthelia
Apothomanthus
Arachinopsis
Arnellia
Balantiopsis
Bazzania
Blasia
Blepharistoma
Calobryum
Calycularia
Calypogeia
Cavicularia
Cephalozia
Chaetocolea
Chandonanthus
Chiloscyphus
Clasmatocolea
Conoscyphus
Cuspidatula
Delavayella
Dendroceros
Diplophyllum
Fossombronia
Gackstoemia
Geocalyx
Gongylanthus
Gyrothyra
Haplomitrium
Harpanthus
Herpocladium
Herzogobryum
Hygrobiella
Hygrolembidium
Hymenophytum
Isotachis
Jackiella
Jamesoniella
Jubula
Jungermannia
Leioscyphus
Lembidium
Lepicolea
Lepidolaena
Lepidozia
Leptoscyphus
Lethocolea
Lophocolea
Lophozia
Madotheca
Makinoa
Marsupella
Marsulidium
Mastigobryum
Mastigopsis
Mastigopelma
Mastigophora
Metzgeria
Metzgeriopsis
Micropterygium
Moerkia
Monoclea
Myriocolea
Mytilopsis
Nardia
Neesioscyphus
Notoscyphus
Nowellia
Odontoschisma
Pellia
Pallavicinius
Plagiohila
Pleuroclada
Pleurozia
Prasanthus
Pseudomarsupidium
Psiloclada
Pteropsiella
Ptilidium
Radula
Riccardia
Saccogyna
Saccogynidium
Scapania
Schiffneria
Schisma
Schistochia
Solenostoma
Southbya
Sphenolobus
Sprucella

Stephaniella
Symphyogyna
Symphiomitra
Syzygiella
Treubia
Trichocolea
Tylimanthus
Wettsteinia
Zoopsis

The total number of specimans in this collection is 3, 589.